



cantabria labs

APLICACIÓN CLÍNICA del AM3[®]

INMUNOMODULADOR PARA
EL SISTEMA INMUNITARIO



Dr. Leovigildo Ginel Mendoza

Grupo de trabajo IMVAP (Infecciones,
Migrante, Vacunas y Actividades
Preventivas) de SEMERGEN



Dr. Francesc Xavier Díaz Carrasco

Grupo de trabajo de Niño y adolescente
de SEMERGEN

APLICACIÓN
CLÍNICA del AM3®
INMUNOMODULADOR PARA
EL SISTEMA INMUNITARIO




Caso
Clínico
1



Infecciones
recurrentes de
vías altas

Caso
Clínico
2



Optimización de la
respuesta vacunal
en un paciente
geriátrico

Caso
Clínico
3



Dermatitis atópica
y molusco
contagioso

Caso
Clínico
4



Infecciones
recurrentes tracto
respiratorio
superior



Caso clínico 3

DERMATITIS ATÓPICA Y MOLUSCO CONTAGIOSO

Presentación del Caso

Datos del paciente:

- Niño de 2 años, correctamente vacunado según calendario vacunal
- Sin alergias medicamentosas
- Sin antecedentes perinatales de interés
- Antecedentes familiares destaca rinitis alérgica por parte del padre

Evolución del caso:

- A los **4 meses** de edad consulta por dermatitis en cuello, pliegues y muslo. Se realiza diagnóstico de dermatitis atópica y se trata con corticoides tópicos con mejoría a la semana de inicio de tratamiento.
- A los **6 meses** en revisión según protocolo de actividades preventivas y promoción de la salud en edad pediátrica (PAPPS), destaca nuevamente dermatitis atópica que se trata con crema hidratante.
- A los **8 meses** en revisión PAPPS, presenta mejoría de la dermatitis del cuerpo, sin embargo, destaca dermatitis seborreica del cuero cabelludo que se trata con crema emoliente específica para esta entidad, con mejoría.
- A los **15 meses**, acude a consulta por brote generalizado de dermatitis atópica que requiere tratamiento con crema hidratante y corticoide tópico. A los 5 días consulta por lesiones impetiginizadas que se trata con antibiótico tópico sin la mejoría esperada, ya que reconsulta a las 48 horas, siendo necesario la administración de antibiótico vía oral para tratar las lesiones dérmicas. También se observan 2 moluscos contagioso en cuello en los cuales mantenemos con conducta expectante.
A los 10 días observamos resolución del cuadro y mantenemos tratamiento con crema hidratante.
- A los **17 meses**, acude con nuevo brote de dermatitis atópica y se decide tratar una crema inmunosupresora durante 3 meses.

- A los **21 meses**, consulta por aparición de numerosas lesiones por molusco contagioso (>50) en tronco, cuello y muslos. Persiste dermatitis atópica. Se le propone a la familia la toma de AM3® y zinc en sobres durante 3 meses.
- En revisión de los **24 meses**, se aprecia una mejoría franca de la dermatitis atópica, persisten los moluscos (<30), por lo que se recomienda seguir 3 meses más de tratamiento con AM3® y zinc.
- Control a los **25 meses** de edad, persisten todavía algunas lesiones, pero se mantiene asintomático en cuanto a la dermatitis atópica.

Conclusiones

El uso del inmunomoduladores con AM3® (glucomanano y proteína de soja) y zinc, puede tener ciertos beneficios en la piel atópica y en la infección por moluscos contagiosos, debido a:

- **Fortalecimiento del sistema inmunológico:** Puede ayudar a reducir infecciones cutáneas secundarias comunes en la piel atópica.
- **Modulación de la respuesta inmune:** Puede favorecer un mejor equilibrio del sistema inmune y reducir la inflamación.
- **Efecto antioxidante:** El zinc contribuye a la regeneración de la piel y ayuda a disminuir el daño celular.



cantabria labs

INMUNOFERON



ADULTOS



60 Cápsulas

90 Cápsulas

NUEVO



30 comprimidos bucodispersables

POSOLOGÍA

2 CÁPSULAS/DÍA
EN 1 ÚNICA TOMA

1
COMPRIMIDO/DÍA

NIÑOS



Junior Jarabe

POSOLOGÍA

5 ML UNA VEZ AL DÍA
a partir de 3 años

Complementos alimenticios